

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Nasivin[®] 0,05%



Nosní kapky, roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MERCK KGaA, 64271 Darmstadt, SRN

Složení

Oxymetazolini hydrochloridum 0,05 g ve 100 ml vodného roztoku.

Pomocné látky: dihydrát edetanu disodného, benzalkonium chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, čišťená voda.

Indikační skupina

Otorhinolaryngologica.

Charakteristika

Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru Eustachovy trubice.

Indikace

Nasivin 0,05 % se používá při akutní rýmě z nachlazení, vazomotorické a alergické rýmě, zánětu středouší, kataru Eustachovy trubice, zánětu vedlejších nosních dutin. Je určen dospělým a dětem od 8 let. Těhotné ženy a kojící matky by se před užíváním Nasivinu 0,05 měly poradit s lékařem.

Kontraindikace

Při přecitlivělosti na oxymetazolin se přípravek nesmí užívat. Dále by přípravek neměli užívat pacienti se závažným onemocněním srdce a krevního oběhu. Nemocní se zeleným očním zákalem (glaukom) by se před užitím Nasivinu 0,05 měli poradit s lékařem. Nasivin nosní kapky by neměl být používán při zánětech kůže a sliznice v okolí nosních vchodů s tvorbou strupů (např. suchá rýma - rhinitis sicca). Pouze na doporučení lékaře mohou přípravek užívat pacienti s koronárním a jiným těžkým srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo onemocněním štítné žlázy.

Nežádoucí účinky

Občas se může vyskytnout pálení, suchost nosní sliznice a kýchání. Ojedinelé, po odeznění účinku, je výraznější pocit „ucpaného nosu“. Zřídka se po užití Nasivinu mohou objevit oběhové příznaky jako bušení srdce, zrychlená akce srdeční a vzestup krevního tlaku. Velice zřídka se může objevit nespavost, podrážděnost, nebo naopak zvýšená spavost. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí užívání přerušete a poradte se s lékařem.

Interakce

Při současném nebo předchozím užívání léků proti depresi (tricyklická antidepresiva) se může zvýšit krevní tlak.

Dávkování

Neurčí-li lékař jinak, vkápneme 1 - 2 kapky 2 - 3 x denně do každého nosního vchodu.

Způsob použití

K usnadnění a k zajištění přesného dávkování je Nasivin 0,05 % vybaven dávkovací pipetou.



Upozornění

Nasivin 0,05 % nesmí být používán u novorozenců, kojenců a předškolních dětí.

Nemocní s glaukomem, těhotné a kojící ženy by se o užívání Nasivinu měli poradit s lékařem.

Užíváte-li jiné léky na předpis, nebo volně prodejné, poradte se o užívání Nasivinu s lékařem. Bude-li Vám lékař předepisovat nějaké léky, upozorněte jej, že užíváte Nasivin.

Nasivin se nemá používat častěji než je doporučeno. Bez lékařského doporučení by neměl být přípravek podáván déle než 1 týden. Dlouhodobé užívání oxymetazolinu může způsobit přechodné poškození nosní sliznice a řasinkového systému, ale může vést až k trvalému poškození sliznice (rhinitis sicca).

Pokud se příznaky nezlepší do 1 týdne nebo se objeví nežádoucí účinky, poradte se s lékařem. Dojde-li k vypití přípravku dítětem nebo i dospělým, vyhledejte lékaře.

Uchovávání

Při teplotě do 25 °C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

Kapací lahvička s 10 ml vodného roztoku.

Datum poslední revize

8. 9. 2004



Nasivin 0,05% - PŘÍBALOVÝ LETÁK (1. str CZ text)

(nová verze 3.kor.)