

Příbalová informace: informace pro uživatele

RECREOL 50 mg/g krém

dexpantenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je RECREOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RECREOL používat
3. Jak se RECREOL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak RECREOL uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je RECREOL a k čemu se používá

Přípravek RECREOL obsahuje léčivou látku dexpantenol, která patří do skupiny přípravků k léčbě ran a vředů. Dexpantenol se v tkáních přeměňuje na kyselinu pantothenovou. Kyselina pantothenová obnovuje pružnost pokožky a podporuje hojení ran.

Přípravek RECREOL se používá:

- k podpůrné léčbě povrchových poškození kůže (jako jsou drobné popáleniny a tržné rány, oděrky a praskliny kůže), zánětů kůže (v důsledku radioterapie, fototerapie nebo ultrafialového záření).

Přípravek RECREOL lze používat u dětí, dospívajících a dospělých.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RECREOL používat

Nepoužívejte přípravek RECREOL:

- jestliže jste alergický(á) na dexpantenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- na rány, jestliže máte hemofilii (dědičná porucha srážlivosti krve) kvůli riziku závažného krvácení.

Upozornění a opatření

V případě alergické reakce je třeba používání přípravku RECREOL ukončit.

Vyhněte se kontaktu přípravku RECREOL s očima.

Další léčivé přípravky a RECREOL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neexistují žádné důkazy o vzájemném působení přípravku RECREOL s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Během těhotenství nebo v období kojení může být přípravek RECREOL používán pouze se souhlasem Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Nebyly provedeny žádné studie účinku dexpanthenolu na plodnost člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek RECREOL nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek RECREOL obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol, tuk z ovčí vlny a propylenglykol

Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Tento přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

3. Jak se RECREOL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Pokud není doporučeno jinak, krém má být na postižené místo aplikován v tenké vrstvě jednou nebo několikrát denně podle potřeby.

Délka léčby závisí na povaze a průběhu onemocnění. Pokud se po 14 dnech používání přípravku nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem

Použití u dětí

Dexpanthenol může být používán u dětí.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku RECREOL je příliš silný nebo příliš slabý, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): alergické reakce a alergické kožní reakce, kontaktní dermatitida, alergická dermatitida, svědění, zarudnutí, ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže a vředy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak RECREOL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek RECREOL obsahuje

- Léčivou látkou je dexpanthenolum. Jeden gram krému obsahuje dexpanthenolum 50 mg.
- Dalšími složkami jsou racemický pantolakton, fenoxylethanol, draselná sůl cetyl-fosfátu, tuk z ovčí vlny, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropyl-myristát, čištěná voda.

Jak RECREOL vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní bílý nebo nažloutlý krém s charakteristickým zápachem.

30 g nebo 50 g krému v hliníkové tubě. Tuba je uzavřena hliníkovou membránou a opatřena bílým šroubovacím uzávěrem. Hliníková tuba je uložena v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Estonsko | RECREOL |
| Lotyšsko | RECREOL 50 mg/g krēms |
| Litva | RECREOL 50 mg/g kremas |
| Česká republika | RECREOL |
| Slovensko | RECREOL 50 mg/g krém |
| Maďarsko | RECREOL 50 mg/g krém |

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 8. 2019.